

SideFER[®]

DAMLA



**Sukrozomiyal[®] demir içeren sıvı
takviye edici gıda**

30 ml'lik şişe + 1 adet toz paket (stik)

SideFER[®] DAMLA

Sukrozomiyal[®] demir içeren sıvı takviye edici gıda.

30 ml şişe ve 1.9 gr'lık 1 adet toz paket (stik).

Karışımın net ağırlığı 36.35 g. **e**

Stik İçindekiler: Sukrozomiyal[®] demir:[ferrik pirofosfat (demir), emülgatör: yağ asitlerinin sukroz esterleri, ayçiçeği lesitin, prejelatinize pirinç nisaştası], Maltodekstrin

Şişe İçindekiler: Su, sukroz, maltodekstrin, aroma verici: **süt** aroması, koruyucu: potasyum sorbat, kıvam arttırıcı: ksantan gam, koruyucu: sodyum benzoat, asitlik düzenleyici: sitrik asit, emülgatör: yağ asitlerinin sukroz esterleri

İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.

Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Uyarılar: 25°C'yi aşmayacak şekilde oda sıcaklığında saklayınız.

Doğrudan ısı kaynaklarına, güneş ışınlarına veya sıvılara temastan kaçınınız.

Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.

Parti numarası ve tavsiye edilen tüketim tarihi (T.E.T.T.) ambalajın üzerindedir.

Hazırlanması: Stik içeriğini birlikte verilmiş olan şişenin içine boşaltınız. Şişenin kapağını kapattıktan sonra çalkalayınız. Her kullanımdan önce şişenin çalkalanması önerilmektedir.

- 1- Şişeyi açınız ve kapağı muhafaza ediniz.
- 2- Stik içeriğindeki tozu şişeye dökünüz.
- 3- Şişenin kapağını kapatınız (damlalığı kullanmadan) ve 1 dakika bekletiniz.
- 4- Şişeyi kuvvetlice çalkalayınız.
- 5- **Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.**

Sulandırmadan kullanmayınız.

Sulandırma işleminden sonra 4°C'de buzdolabında saklayınız.

Kullanım Önerisi: 4-10 yaş grubu çocuklar için sabah veya akşam yemekle birlikte 10 damla (1 ml) doğrudan ağız içine uygulayabileceğiniz gibi yarım bardak suya uygulanarak da içilebilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız.

Çözeltilinin içerisinde kanıştırmadan hemen sonra topaklanma görülse de genelde 10 dakikanın içerisinde bu topaklanmalar kaybolmaktadır. Bu nedenlerden dolayı kanşımı kullanmadan hemen önce hazırlayınız.

4-10 yaş arası çocuklar için kullanımı uygundur.

TEG ONAY NO: 001592-11.11.2016

Bileşen	1 ml miktan	BRD*
Demir	7.00 mg	%50

*Beslenme Referans Değeri

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ!

İhracatçı Firma: Junia Pharma s.r.l. Via Delle Lenze 216/B, 56122 Pisa PI İtalya

İthalatçı Firma: Generica İlaç San. ve Tic. A.Ş.

MOB Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Kat:14 34485 Sarıyer/İSTANBUL

Menşei: İtalya



GENERICA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

MOB Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Kat: 14 34485 Sarıyer/İSTANBUL



TR - Rev.4 of 07.19
KT-205-03